



DOSERINGSGUIDE

REKOVELLE® DOSGUIDE
på sidan 4

IE/ DAG	STIMULERINGS-DAGAR							
	7	8	9	10	11	12	13	14
50	350	400	450	500	550	600	650	700
75	525	600	675	750	825	900	975	1050
100	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
125	875	1000	1125	1250	1375	1500	1625	1750
150	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100
175	1225	1400	1575	1750	1925	2100	2275	2450
200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
250	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
300	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4200
350	2450	2800	3150	3500	3850	4200	4550	4900
400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	5200	5600
450	3150	3600	4050	4500	4950	5400	5850	6300

ANTAL FÖRPACKNINGAR

600 IE	1200 IE
1	0
–	1
1	1
–	2
1	2
–	3
1	3
–	4
1	4
–	5
1	5

TITRERINGS- GUIDE

(Exempel)

100
106,25
112,5
118,5
125
131,25
137,5
143,75
150
156,25
162,5
168,75
175
181,25
187,5
193,75
200

Menopur®

menotropin

MENOPUR® 600 IE och 1200 IE – (human menopausal gonadotropin, HMG).

Beredningsform: injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna.

Indikation: Anovulation, inkl polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), hos kvinnor som ej svarat på behandling med klomifencitrat. Kontrollerad hyperstimulering av ovarierna för att inducera utvecklingen av multipla folliklar inför assisterad befruktning (ART) såsom in vitro fertilisering/embryo transfer (IVF/ET), ”gamete intra-fallopian transfer” (GIFT) samt intra-cytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI).

Ska inte användas av kvinnor med tumörer i hypofysen eller hypotalamus, ovarie-, livmoder- eller bröstcancer, gynekologiska blödningar av okänd etiologi, ovariella cystor eller ovariell förstoring som ej beror på polycystiskt ovariesyndrom eller vid graviditet och amning. Ska inte användas i följande situationer då adekvat behandlingssvar inte är sannolikt: primär ovariell svikt, missbildningar av könsorganen eller myom i livmodern som ej är förenliga med graviditet. Gonadotropinbehandling fordrar regelbunden övervakning av äggstockarnas respons. Innan behandling påbörjas, bör en fertilitetsutrdning göras och eventuella kontraindikationer mot graviditet utredas. Särskilt bör patienten undersökas med avseende på störd thyroidea- eller binjurebarkfunktion, hyperprolaktinemi samt tumörer i hypofys eller hypotalamus. Stimulering av follikeltillväxt kan leda till ovariell förstoring eller hyperstimulering. Frekvensen av dessa fall minimeras om instruktioner följs och behandlingen noggrant övervakas.

Varningar och försiktighet: Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS), flerbörd, missfall, ectopisk graviditet, tumörer i reproduktionsorganen, medfödda missbildningar, venös trombolism.

ATC kod: G03GA02. Förpackningsstorlekar: 1 x 600 IE, 1 x 1200 IE.

Rx, (F) Menopur subventioneras inte vid äggfrysning av sociala skäl. SPC uppdaterad (2021-08-18).

För ytterligare information och information om priser se www.fass.se.

Rekovele®

follitropin delta

REKOVELLE® 12 mikrog/0,36 ml, 36 mikrog/1,08 ml, 72 mikrog/2,16 ml (follitropin delta)

Beredningsform: injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna.

Indikation: Kontrollerad ovariell stimulering av multipel follikelutveckling hos kvinnor som genomgår assisterad befruktning (ART) såsom in vitro-fertilisering (IVF) eller intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI).

ATC kod: G03GA10 Förpackningsstorlekar: 12 mikrog/0,36 ml, 36 mikrog/1,08 ml, 72 mikrog/2,16 ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna.

Ska inte användas av kvinnor med tumörer i hypofysen eller hypotalamus, ovarie-, livmoder- eller bröstcancer, gynekologiska blödningar av okänd etiologi, ovariella cystor eller ovariell förstoring som ej beror på polycystiskt ovariesyndrom eller vid graviditet och amning. Ska inte användas i följande situationer då adekvat behandlingssvar inte är sannolikt: primär ovariell svikt, missbildningar av könsorganen eller fibroida tumörer i livmodern som ej är förenliga med graviditet.

Gonadotropinbehandling fordrar regelbunden övervakning av ovariesvaret. Innan behandling påbörjas, bör en fertilitetsutrdning göras och eventuella kontraindikationer mot graviditet utredas. Framförallt bör patienten undersökas för hypotyreos och hyperprolaktinemi. Stimulering av follikeltillväxt kan leda till ovariell förstoring eller hyperstimulering. Frekvensen av dessa fall minimeras om rekommenderad dos och administreringssätt följs och behandlingen noggrant övervakas.


Varningar och försiktighet: Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS), tromboemboliska händelser, ovariell torsion, flerbörd, missfall, ectopisk graviditet, tumörer i reproduktionsorganen, medfödda missbildningar. Har inte studerats hos patienter med måttligt eller svårt nedsatt njur- eller leverfunktion.

Rx, (F) Rekovele subventioneras inte vid äggfrysning av sociala skäl. SPC uppdaterad (2023-07-20).

För ytterligare information och information om priser se www.fass.se.



Ferring Läkemedel AB • Box 4041 • 203 11 Malmö • ferring.se • SE-MR-2400007 Mars 2024



µg/ DAG	STIMULERINGS DAGAR							
	7	8	9	10	11	12	13	14
6.00	42	48	54	60	66	72	78	84
7.00	49	56	63	70	77	84	91	98
8.00	56	64	72	80	88	96	104	112
9.00	63	72	81	90	99	108	117	126
10.00	70	80	90	100	110	120	130	140
11.00	77	88	99	110	121	132	143	154
12.00	84	96	108	120	132	144	156	168
13.00	91	104	117	130	143	156	169	182
14.00	98	112	126	140	154	168	182	196
15.00	105	120	135	150	165	180	195	210
16.00	112	128	144	160	176	192	208	224
17.00	119	136	153	170	187	204	221	238
18.00	126	144	162	180	198	216	234	252
20.00	140	160	180	200	220	240	260	280
22.00	154	176	198	220	242	264	286	308
24.00	168	192	216	240	264	288	312	336

	12 µg	36 µg	72 µg
48	1	1	
60	2	1	
72			1
84	1		1
96	2		1
108		1	1
120	1	1	1
132	2	1	1
144			2
156	1		2
168	2		2
180		1	2
192	1	1	2
204	2	1	2
216			3
228	1		3
240	2		3
252		1	3
264	1	1	3
288			4
312	2		4
336	1	1	4